



# BADANIE TK Z DOŻYLNYM PODANIEM ŚRODKA KONTRASTOWEGO

## INFORMACJA DLA PACJENTA / ZGODA NA BADANIE

Badanie tomografem komputerowym to szybkie bezbolesne badanie diagnostyczne - wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie do uzyskania obrazów wnętrza ludzkiego ciała. Przy niektórych badaniach podajemy dożylnie środek kontrastowy, to umożliwia postawienie właściwej diagnozy przez specyficzny wpływ na obraz poszczególnych narządów.

Badanie trwa zwykle do 30 minut. W przypadku niektórych badań z dożylnym podaniem środka kontrastowego może wydłużyć się do 40 - 50 minut. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać dyskomfort powodowany koniecznością leżenia przez kilkanaście minut w bezruchu. Podczas badania pacjent cały czas pozostaje w zasięgu wzroku personelu pracowni i ma z nim możliwość kontaktu głosowego.

Podczas wykonywania badań z dożylnym podaniem środka kontrastowego może pojawić się uczucie „uderzenia” ciepła, metaliczny posmak w ustach - jest to normalne zjawisko.

W czasie badania konieczne jest stosowanie się do poleceń głosowych personelu.

### WSZELKIE DOLEGLIWOŚCI I NIEPOKOJĄCE OBJAWY NALEŻY NATYCHMIAST ZGŁASZAĆ PERSONELOWI MEDYCZNEMU

- wszelkie nagłe dolegliwości (np. ból w okolicy wkłucia dożylnego),
- jakiegokolwiek objawy po podaniu dożylnego środka cieniującego (duszność, zawroty głowy, nudności).

### PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Do badania z dożylnym podaniem środka kontrastowego należy zgłosić się na czczo (około 6-8 godzin od ostatniego posiłku).

Nie należy zmieniać dotychczasowego leczenia farmakologicznego (normalnie zażyć leki).

### NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ WYNIKI DOTYCHCZASOWYCH BADAN OBRAZOWYCH BADANEJ OKOLICY - TK, MR, RTG (ZDJECIA, PŁYTY CD)

### ORAZ WYPISY Z POBYTÓW SZPITALNYCH

**Osoby chore na cukrzycę powinny ten fakt zgłosić personelowi pracowni.**

**BADANIE JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY MAŁEJ.** W tym badaniu oprócz dożylnego, podaje się również środek kontrastowy doustnie. Personel pracowni przygotowuje od około 0,5 do 1,5l roztworu wody i środka kontrastowego. Roztwór może mieć lekko kwaśny smak. Mieszaninę należy wypić małymi łykami, w czasie wyznaczonym przez personel pracowni.

### PRZECIWSKAZANIA DO BADANIA

Bezwzględny przeciwwskazaniem do podania jodowego środka cieniującego są:

- uczulenie na jod
- wole toksyczne tarczycy
- ostry krwotok śródmózgowy

Badania TK nie należy wykonywać również:

- u kobiet w ciąży
- u pacjentów, którzy nie mogą dłużej pozostawać w pozycji leżącej

W stanach zagrożenia życia nie ma przeciwwskazań do badania TK. Jeśli jest to bezwzględnie konieczne można badać nawet kobiety w ciąży.

### CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE RYZYKO WYSTĄPIENIA POWIKŁAŃ:

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- stwierdzona nadwrażliwość na środki kontrastujące,</li> <li>- skłonność do alergii,</li> <li>- nadczynność tarczycy, wole,</li> <li>- poważne schorzenia układu sercowo-naczyniowego,</li> <li>- zły stan ogólny, odwodnienie,</li> <li>- ciężkie zaburzenia czynności nerek</li> <li>- ciężkie zaburzenia czynności wątroby,</li> <li>- zaawansowana cukrzyca,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ciężkie schorzenia układu oddechowego,</li> <li>- uszkodzenie mózgu,</li> <li>- wiek powyżej 65 lat,</li> <li>- noworodki, niemowlęta,</li> <li>- osoby nadmiernie pobudzone,</li> <li>- powtórne podanie środka kontrastującego w krótkim czasie (w ciągu 72 godzin),</li> <li>- anemia sierpowata.</li> </ul> |
|---|--|

Jeżeli w wyniku badania krwi stwierdzono podwyższony poziom kreatyniny o wykonaniu badania tomografem komputerowym z dożylnym podaniem środka kontrastowego decyduje lekarz.

### MOŻLIWE POWIKŁANIA

Stosowane w naszej pracowni środki kontrastowe podawane dożylnie to preparaty bezpieczne, o znikomym ryzyku wystąpienia objawów uczuleniowych.

Obecnie reakcje uboczne po podaniu środków kontrastowych zdarzają się **bardzo rzadko**, dzielą się one na:

- lekkie: nudności, wymioty, pokrzywka, świąd skóry, chryпка, kaszel, kichanie, obfite pocenie się, uczucie ciepła;
- umiarkowane: omdlenie, ciężkie wymioty, rozległa pokrzywka, obrzęk twarzy, obrzęk krtani, skurcz oskrzeli;
- ciężkie: drgawki, obrzęk płuc, wstrząs, zatrzymanie oddechu, zatrzymanie krążenia.

**PO BADANIU** pacjent musi pozostać pod obserwacją personelu pracowni TK przez co najmniej 30 minut.

Pacjentki **karmiące piersią** w przypadku badania z dożylnym podaniem środka kontrastowego nie powinny karmić przez **24 godziny**.

**Pacjent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie środka kontrastowego, jednak w takich przypadkach wartość diagnostyczna badania może być znacznie ograniczona**

Imię i nazwisko pacjenta .....

PESEL (lub rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość) .....

Zostałem poinformowany o możliwych powikłaniach. **Wyrażam świadomą zgodę** na wykonanie badania tomografii komputerowej z dożylnym podaniem środka kontrastowego

data ..... czytelny podpis pacjenta/ opiekuna\* .....

**Nie wyrażam zgody** na dożylnie podanie środka kontrastowego

data ..... czytelny podpis pacjenta/ opiekuna\* .....

**Oświadczam, że nie jestem w ciąży** (dotyczy kobiet) data ..... czytelny podpis pacjenta/ opiekuna\* .....